

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Альбендазим 20 %»

1. Торговое наименование.

Альбендазим 20 %.

2. Международное непатентованное наименование или общепринятое наименование, или химическое наименование.

Альбендазол (albendazole).

3. Регистрационный номер.

№ 7525-10-21 БСПА.

4. Лекарственная форма и описание.

Порошок для приема внутрь.

Порошок от беловато-кремового до серого цвета.

5. Состав и наименования вспомогательных веществ.

В 1,0 г препарата содержится 200 мг альбендазола, вспомогательные вещества: лактоза, кремния диоксид коллоидный.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Антигельминтные средства.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Альбендазим 20 % – антигельминтный препарат.

Альбендазол, входящий в состав препарата, относится к группе бензимидазолов, обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении половозрелой и личиночной стадии нематод (в том числе *Strongylata spp.*, *Neoascaris vitulorum*, *Dictyocaulus viviparus*, *Dictyocaulus filaria*, *Ascaris suum*, *Trichocephalus suis*, *Oesophagostomum spp.*, *Ollulanus tricuspis*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*), цестод (в том числе *Moniezia spp.*, *Diphyllbothrium latum*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Khawia sinensis*, *Bothriocephalus gowkongensis*, *Ligula intestinalis*); а также половозрелых трематод (в том числе *Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.*, *Dicrocoelium lanceatum*); обладает овоцидным действием.

Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в избирательном подавлении полимеризации бета-тубулина, нарушении активности микротубулярной системы клеток кишечного канала гельминтов; подавлении утилизации глюкозы, блокаде передвижения секреторных гранул и других органелл в мышечных клетках, таким образом обуславливая их гибель.

Препарат не обладает гепатотоксическим и сенсibilизирующим действием; при пероральном введении быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани; из организма выводится, в основном, с мочой и желчью, у лактирующих животных – частично с молоком.

8. Показания для применения.

Альбендазим 20 % применяют для профилактики и лечения крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, собак, прудовых рыб при гельминтозах.

9. Противопоказания.

Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к альбендазолу. Запрещается применение препарата при остром фасциолезе, а также истощенным и больным инфекционными болезнями животным.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют животным однократно, перорально в смеси с кормом, без предварительной диетической подготовки по следующим схемам:

– крупному рогатому скоту при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 37,5 мг на 1 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); при фасциолезе, парамфистоматозе – 50 мг на 1 кг массы тела животного (10 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); при неоскариозе – 50 мг на 1 кг массы тела животного, двукратно (10 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного, двукратно);

– овцам при фасциолезе, мониезидозе – 37,5 мг на 1 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного); при диктиокаулезе, стронгилятозах желудочно-кишечного тракта, стронгилоидозе – 25 мг на 1 кг массы тела животного (5,0 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного);

– свиньям при аскариозе, трихоцефалезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, оллуланозе – 37,5 мг на 1 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного);

– лошадям при параскариозе, оксиурозе, стронгилятозах – 37,5 мг на 1 кг массы тела животного (7,5 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного);

– собакам при токсаскариозе, токсакариозе, унцинариозе, цестодозах – 100 мг на 1 кг массы тела животного (20 мг альбендазола на 1 кг массы тела животного).

Прудовым рыбам препарат применяют при кавиозе, боттриоцефалезе, лигулезе – 2,5 кг препарата на 1 т корма методом группового скармливания, 1 раз в день 2 дня подряд (из расчета 5 % лечебного корма от массы рыбы; 50 мг альбендазола на 1 кг массы рыбы).

Перед массовыми обработками каждую серию препарата испытывают на небольших группах животных (5-15) различной упитанности и возраста. Если у животных в течение 2 суток после обработки не отмечены признаки токсикоза, приступают к обработке всего поголовья.

Дегельминтизация рыб проводится в течение третьей декады июня-июля.

Дегельминтизацию животных с лечебной целью проводят по показаниям, с профилактической – весной перед выгоном на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке у животных может наблюдаться нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, вялость, снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

13. Беременность и период лактации.

Запрещается применение препарата во время случного периода, стельным коровам в первую треть беременности, а суягным овцам и козам в первую половину беременности.

14. Особые указания.

Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации препарат необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений у животных при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к производным группы бензимидазола и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Совместное применение препарата с празиквантелом и дексаметазоном приводит к увеличению концентрации альбендазола в крови животного.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500 и 1000 г.

18. Срок годности.

Срок годности — 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного лекарственного препарата продуктивным животным.

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 20 дней после дегельминтизации. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Молоко продуктивных животных разрешается использовать в пищу людям через 7 дней после дегельминтизации. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано после кипячения в корм животным.

Реализация товарной рыбы производится через 14 дней после последнего применения препарата. В случае вынужденного отлова рыбы ранее указанных сроков, рыба может быть использована для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Наименование и адрес производственной площадки: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 63 от 26.08.2026г