

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от 14 марта 2019 г. № 100

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Флосол 30%»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Флосол 30% (Flosolum 30%).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: флорфеникол.

1.2 Флосол 30% представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола, вспомогательные вещества: бензиловый спирт, полиэтиленгликоль-400.

1.3 Препарат выпускают в полимерной упаковке по 100 и 1000 мл.

1.4 Препарат хранят по списку Б при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С, в защищенном от света месте.

Срок годности - 3 (три) года от даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. После вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 28 дней.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола. Флорфеникол обладает широким спектром действия; активен в отношении *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.* и др., а также *Mycoplasma spp.*

2.2 Механизм действия флорфеникола основан на связывании с 50S субъединицей рибосом в протоплазме бактериальной клетки, где блокирует действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза белка у бактерий. Флорфеникол действует бактериостатически.

2.3 После приема препарата внутрь флорфеникол быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и хорошо проникает в большинство органов и тканей организма.

Выделяется флорфеникол преимущественно с фекалиями у животных и с пометом у птиц.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Флосол 30% применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, микоплазмозе сельскохозяйственной птицы; актинобациллярной плевропневмонии, пастереллезе, бордетеллезе, гемофилезе свиней и других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к флорфениколу.

3.2 Флосол 30% применяют течение 3 – 5 дней в следующих дозах:

- свиньям: 0,15 - 0,2 мл/10 кг массы тела животного с водой 2 раза в день;
- птице (цыплята до 4-х недельного возраста): 330 мл препарата на 1000 л воды или 0,04 мл/кг массы тела птицы при индивидуальной даче;
- птице (другие возрастные категории): 700 мл препарата на 1000 л воды или 0,07 мл/кг массы тела птицы при индивидуальной даче.

Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица **должна** получать только воду, **содержащую препарат**.

3.3 Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кровообразования, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к амфениколам.

3.4 Не допускается применение препарата для лечения свиноматок в период беременности и лактации, а также хряков-производителей. Не рекомендуется одновременное применение флосола 30% с другими антибиотиками, непрямymi антикоагулянтами, барбитуратами, миорелаксантами.

Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям.

3.5 В рекомендуемых дозах осложнений, как правило, не наблюдается. В редких случаях у поросят возможны покраснение тканей перианальной области, отек прямой кишки, проходящие самопроизвольно без назначения симптоматических средств, а также аллергические реакции.

При наличии аллергических реакций применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.6 Действующее вещество препарата может выпадать в осадок в случае, если концентрация флорфеникола в воде превышает 1 г на 1 л, что соответствует 3,3 мл флосола 30% на 1 л воды.

3.7 Убой на мясо свиней разрешается через 23 суток, птицы - не ранее, чем через 6 суток после последнего применения препарата.

Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

4.2 Тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ООО «Промветсервис», 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, 12/2а, Тел/факс +375 17 503-53-67.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (И.А. Ятусевич), внутренних незаразных болезней животных (В.Н. Иванов) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Промветсервис» (М.А. Степанюга).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	<i>[подпись]</i>
Секретарь	<i>[подпись]</i>
Эксперт	<i>[подпись]</i>
14 марта 2019 г. протокол № 100	