

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от «24» февраля 2022 г. № 119.

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата ветеринарного «ЛЕВАМИЗОЛ 100»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Левамизол 100 (Levamisolum 100).

Международное непатентованное наименование активной фармацевтической субстанции: левамизол.

1.2 Препарат представляет собой порошок от белого до светло желтого цвета, растворимый в воде.

В 1,0 г препарата содержится 100 мг левамизола гидрохлорида, наполнитель: глюкоза моногидрат.

Лекарственная форма: порошок для орального применения.

1.3 Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 500, 1000 г.

1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от 0 °С до плюс 25 °С, в защищенном от света и влаги месте.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления. Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Левамизол 100 – антигельминтный препарат, включающий в себя левамизола гидрохлорид (соединение из группы имидазолов).

2.2 Левамизол активен в отношении желудочно-кишечных и легочных нематод, в том числе *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Neoascaris vitulorum*, *Bunostomum spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Cooperia spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Strongyloides papillosus*, паразитирующих у жвачных животных; *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Metastrongylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, паразитирующих у свиней; *Syngamus spp.*, *Heterakis spp.*, *Cappilaria spp.*, *Amidostomum spp.*, *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Syngamus trachea*, *Amidostomum anseris*, паразитирующих у птицы.

2.3 Механизм действия препарата заключается в нарушении энергетического обмена у нематод за счет ингибирования фермента фумаратредуктазы, что приводит к гибели и элиминации гельминтов из организма животных.

2.4 Левамизол выводится из организма в основном с мочой (70 %) и частично с фекалиями.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Левамизол 100 применяют крупному и мелкому рогатому скоту при диктиокаулезе, гемонхозе, буностомозе, эзофагостомозе, нематодирозе, остертагиозе, хабертиозе, коопериозе, стронгилоидозе; свиньям – при аскариозе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, метастронгилезе, птице – при аскаридиозе, капилляриозе, гетеракидозе и других нематодозах животных.

3.2. Препарат применяют однократно в следующих дозах:

– крупному рогатому скоту: 7,5 г на 100 кг массы тела животного с водой или кормом;

– мелкому рогатому скоту: 0,75 г на 10 кг массы тела животного с водой или кормом;

– свиньям: 1 кг на 1000 л питьевой воды или 1 т корма (0,75 г/10 кг массы тела животного);

– сельскохозяйственной птице: 1 кг на 1000 л питьевой воды.

3.3 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений и осложнений.

При передозировке левамизола отмечаются колики, кашель, повышенное слюноотделение, возбуждение, слезотечение, спазмы, повышенное потоотделение, рвота, усиленная дефекация и мочеотделение. Антидот: атропина сульфат.

3.4 Перед массовыми обработками каждую новую партию препарата предварительно испытывают на 10-15 животных за 3 дня до основной обработки. При отсутствии осложнений приступают к обработке всего поголовья.

3.5 Не допускается применять препарат одновременно с пирантелом, морантелом.

3.6 Не рекомендуется применение препарата истощенным животным и птице, быкам-производителям, баранам и хрякам-производителям.

3.7 Запрещается применять препарат птице, чье яйцо используется в пищу людям; овцам и козам, молоко которых используется в пищу людям; стельным коровам в последнюю треть стельности; свиноматкам за 14 дней до опороса.

3.8 Убой животных и птицы на мясо допускается не ранее, чем через 10 дней после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

Употребление молока от коров в пищевых целях разрешается не ранее, чем через 4 дня после последнего применения препарата. Молоко, полученное в период лечения препаратом и до истечения 4 дней после последнего применения, может быть использовано для кормления животных.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствия препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промветсервис» (юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503 53 67).

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская ½, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедр фармакологии и токсикологии (Ятусевич И.А., Смаглей Т.Н.), паразитологии (Захарченко И.П., Бородин Ю.А.) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Промветсервис» (Дмитриева А.А., Степанюга М.А.).

