

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Респирон Пиг»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Респирон Пиг (RespiRon Pig).

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: флорфеникол, флуниксин.

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения.

1.2 Респирон Пиг представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до желтого цвета.

В 1,0 мл препарата содержится 300 мг флорфеникола и 36,5 мг флуниксина меглумина, вспомогательные вещества: N-метил-2-пирролидон, 1,2-пропиленгликоль, вода для инъекций.

1.3 Респирон Пиг выпускают по 50, 100, 200 мл в стеклянных флаконах из коричневого стекла и по 100 мл в полимерных флаконах белого и коричневого цвета.

1.4 Респирон Пиг хранят при температуре от 2 °С до 25 °С.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления. После вскрытия флакона препарат необходимо хранить при температуре от 2 °С до 8 °С, использовать в течение 14 дней.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с действующим законодательством.

1.6 Условия отпуска – без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Флорфеникол – синтетический антибиотик, производное тиамфеникола, в молекуле которого гидроксильная группа замещена атомом фтора.

Флорфеникол – бактериостатический антибиотик широкого спектра действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Proteus spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Bordetella spp.*, а также *Mycoplasma spp.*

Механизм действия флорфеникола основан на связывании с 50S рибосомной субъединицей в протоплазме бактериальной клетки, где блокируется действие фермента пептидилтрансферазы, что приводит к подавлению синтеза протеинов чувствительных бактерий.

2.2 Флуниксин меглумин – нестероидное противовоспалительное средство. Оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, жаропонижающее действие. Флуниксин, является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ 1 и ЦОГ 2), угнетает синтез простагландинов E2 – медиаторов воспаления, чем и обусловлен вызываемый им эффект.

2.3 Респирон Пиг быстро всасывается из места введения, проникает во все внутренние органы и ткани организма животного. Действие флорфеникола проявляется спустя 5-6 часов, флуниксина – через 20-30 минут. Флуниксин кумулируется в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект продолжительностью до 24 часов. Терапевтическая концентрация флорфеникола удерживается в организме до 48 часов.

2.4 Выделяются компоненты препарата с фекалиями и мочой.

2.5 Респирон Пиг по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Респирон Пиг применяют для лечения свиней при эшерихиозе (колибактериозе), сальмонеллезе, стафилококкозе, респираторных, желудочно-кишечных и других болезнях, вызванных микроорганизмами чувствительными к флорфениколу.

3.2 Респирон Пиг вводят внутримышечно в область шеи в дозе 1 мл на 10 кг массы тела животного однократно или 1 мл на 20 кг массы тела животного двукратно с интервалом 48 часов.

При необходимости введение препарата повторяют через 48-72 часа.

В одно место рекомендуется вводить не более 10 мл препарата.

3.3 Запрещается применение препарата при тяжелых поражениях системы кроветворения, сердца, печени и почек, а также при индивидуальной повышенной чувствительности к флорфениколу и флуниксину, с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидными препаратами, препаратами, содержащими тиамфеникол и амфеникол. Запрещается смешивать препарат в одном шприце с другими лекарственными средствами.

3.4 Запрещается применение препарата супоросным свиноматкам, хрякам-производителям, истощенным животным.

3.5 При применении препарата возможны аллергические реакции. На месте введения возможно образование припухлости, исчезающей самостоятельно в течение 3-5 дней.

При наличии побочных эффектов применение препарата прекращают, назначают антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.6 Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток после последнего применения препарата. В случае вынужденного убоя ранее этого срока, мясо может быть использовано на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промветсервис» (юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503 53 67).

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская ½, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры фармакологии и токсикологии (Ятусевич И.А., Иванов В.Н.), паразитологии и инвазионных болезней (Захарченко И.П.) УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ООО «Промветсервис» (Дмитриева А.А., Степанюга М.А.).