

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Стрептомицин»

1. Торговое наименование.
Стрептомицин.
2. Международное непатентованное наименование или общепринятое наименование, или химическое наименование.
Стрептомицин (streptomycin).
3. Регистрационный номер.
№ 7432-10-20 БА.
4. Лекарственная форма и описание.
Порошок для приема внутрь.
Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета, растворимый в воде.
5. Состав и наименования вспомогательных веществ.
В 1,0 г препарата содержится 800 мг стрептомицина (в форме стрептомицина сульфата), вспомогательные вещества: глюкоза моногидрат, кремния диоксид коллоидный.
6. Фармакотерапевтическая группа.
Аминогликозиды.
7. Фармакодинамика и фармакокинетика.
Стрептомицина сульфат – антибиотик из группы аминогликозидов.
Стрептомицина сульфат активен в отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе *Pasteurella multocida*, *Listeria monocytogenes*, *Leptospira spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Salmonella spp.*, а также других микроорганизмов чувствительных к стрептомицину сульфату. К стрептомицину устойчивы анаэробные бактерии, грибы, вирусы и простейшие.
Механизм бактерицидного действия заключается в подавлении белкового синтеза микробной клетки, что приводит к образованию неполноценной клеточной стенки и гибели микроорганизма. Стрептомицин действует на микроорганизмы, находящиеся как в стадии размножения, так и в стадии покоя.
При введении внутрь препарат практически не всасывается. Терапевтическая концентрация стрептомицина в различных органах и тканях организма удерживается в течение 8-12 часов. Стрептомицин выводится из организма в основном с мочой в неизменном виде.
8. Показания для применения.
Стрептомицин применяют для лечения молодняка крупного рогатого скота и свиней при желудочно-кишечных болезнях с первых дней жизни, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к стрептомицину.
9. Противопоказания.
Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к стрептомицину.
10. Способ применения и дозы.
Стрептомицин применяют перорально с водой или молоком 2-3 раза в день с интервалом 8-12 часов в следующих дозах:
 - телятам: 10-20 мг на 1 кг массы тела животного в течение первых 3-4 дней жизни;
 - поросётам: 10-20 мг на 1 кг массы тела животного в течение первых 3-4 дней жизни.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке у животных может наблюдаться нарушение координации движений, вялость, судороги.

13. Беременность и период лактации.

—

14. Особые указания.

Препарат запрещен к применению телятам с развитым рубцовым пищеварением.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений у животных при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

В редких случаях могут наблюдаться различные токсические реакции, тахикардия, понос, дерматиты, нарушения координации движения; длительное применение больших доз может вызвать глухоту.

При возникновении побочных и аллергических реакций препарат отменяют и назначают симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Не допускается совместное применение стрептомицина сульфата с другими аминогликозидными препаратами (неомицин, канамицин, мономицин, гентамицин) вследствие возможного усиления нефротоксического действия.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500 и 1000 г.

18. Срок годности.

Срок годности — 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного лекарственного препарата продуктивным животным.

Убой животных на мясо разрешается через 7 суток после последнего применения препарата. Мясо животных, вынуждено убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел/факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Наименование и адрес производственной площадки: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»

(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 63 от 26.08.2026