

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного лекарственного препарата «Тилмитрим порошок»

1. Торговое наименование.

Тилмитрим порошок.

2. Международное непатентованное наименование или общепринятое наименование, или химическое наименование.

Тилмикозин (tilmicosin), энрофлоксацин (enrofloxacin), триметоприм (trimethoprim).

3. Регистрационный номер.

№ 7503-10-21 БА.

4. Лекарственная форма и описание.

Порошок для приема внутрь.

Препарат представляет собой порошок от белого до светло-желтого цвета.

5. Состав и наименования вспомогательных веществ.

В 1,0 г препарата содержится 75 мг тилмикозина, 100 мг энрофлоксацина, 50 мг триметоприма, вспомогательное вещество: глюкоза безводная.

6. Фармакотерапевтическая группа.

Комбинированный антибактериальный препарат.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика.

Тилмитрим порошок – комбинированный антибактериальный препарат широкого спектра действия. Входящие в состав препарата компоненты, активны в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, таких как *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Salmonella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Proteus spp.*, *Shigella spp.*, *Chlamydia spp.* и др.

Тилмикозин – антибиотик широкого спектра действия из группы макролидов. Механизм действия тилмикозина основан на нарушении синтеза белка в микроорганизмах за счет взаимодействия с рибосомами бактериальных клеток.

Энрофлоксацин – противомикробное средство широкого спектра действия из группы фторхинолонов. Механизм действия энрофлоксацина связан с угнетением бактериальной ДНК-гиразы, что приводит к нарушению репликации ДНК бактерий.

Триметоприм – противомикробное средство широкого спектра действия из группы диаминопиримидинов. Механизм действия связан с угнетением бактериальной редуктазы дигидрофолиевой кислоты.

Тилмикозин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, проникает во все органы и ткани организма, где создает терапевтические концентрации. В течение 6 часов тилмикозин достигает необходимой концентрации и начинает действовать на патогенные микроорганизмы в тканях легких и воздухоносных мешках. Действие препарата длится около 24 часов.

Энрофлоксацин хорошо и быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани организма, за исключением нервной ткани. Максимальная концентрация энрофлоксацина в крови достигается через 1-2 часа после введения препарата, а терапевтическая концентрация – на протяжении 24 часов.

Триметоприм при пероральном применении всасывается из желудочно-кишечного тракта в кровь и проникает во все органы и ткани животных. Терапевтическая концентрация в организме сохраняется в течение 12-18 часов.

Компоненты препарата выводятся из организма с калом, желчью и мочой.

8. Показания для применения.

Тилмитрим порошок применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы (цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур) при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных болезнях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к тилмикозину, энрофлоксацину, триметоприму.

9. Противопоказания.

Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

10. Способ применения и дозы.

Препарат применяют перорально с кормом в следующих дозах:

– сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур): 1 кг на 1000 кг корма в течение 3-5 дней. Обработку птицы рекомендуется повторить в середине периода выращивания;

– свиньям: 0,3 г на 10 кг массы тела животного (что соответствует 1 кг на 1000-1500 кг корма) в течение 3-5 дней.

11. Меры предосторожности при применении.

При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

12. Передозировка.

При передозировке у животных может наблюдаться угнетение и нарушение функций желудочно-кишечного тракта.

13. Беременность и период лактации.

Изучение безопасности препарата беременным и лактирующим свиноматкам не проводилось. Возможно применение препарата этим группам животных после соотношения риска и пользы ветеринарным врачом.

14. Особые указания.

Запрещается применять птице, чье яйцо используется в пищу людям.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможно возникновение аллергических реакций, при возникновении которых, использование препарата прекращают и назначают симптоматическое лечение.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается применение совместно с бактериостатическими антибиотиками (макролидами и тетрациклинами), теофиллином и нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и калия.

17. Форма выпуска.

Пакеты из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500 и 1000 г.

18. Срок годности.

Срок годности – 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Не применять по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Препарат хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

20. Условия отпуска.

Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

21. Условия уничтожения.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного лекарственного препарата продуктивным животным.

Убой сельскохозяйственной птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток, свиней – 14 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного препарата.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Наименование и адрес производственной площадки: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМВЕТСЕРВИС».

Адрес юридического лица: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 3. Бядули, д. 12, ком. 2а, тел./факс: +375 (17) 5035367.

Адрес места осуществления деятельности: 222603, Республика Беларусь, Минская обл., Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, д. 1/3, тел./факс: +375 (1770) 27081, info@promvs.by.

СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный
ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)
№ 63 от 26.08.2016