

ИНСТРУКЦИЯ по применению ветеринарного препарата «Суправит»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Суправит (Supravitum).

Международные непатентованные наименования активных фармацевтических субстанций: ретинол, холекальциферол, альфа-токоферол ацетат, менадион, тиамин, рибофлавин, пиридоксин, цианокобаламин, никотинамид, пантотеновая кислота.

Лекарственная форма: раствор для инъекций.

1.2 Препарат представляет собой прозрачную жидкость (допускается опалесценция) от оранжевого до коричневого цвета.

В 1,0 мл препарата содержатся действующие вещества: витамин А – 10 000 МЕ, витамин Д₃ – 2 000 МЕ, витамин Е – 10 мг, витамин К₃ – 1 мг, витамин В₁ – 10 мг, витамин В₂ – 4 мг, витамин В₃ – 30 мг, витамин В₅ – 20 мг, витамин В₆ – 3 мг, витамин В₁₂ – 10 мкг и вспомогательные вещества: гидролизат белка лактоальбумина, нипагин, вода для инъекции.

1.3 Суправит выпускают по 20 мл в стеклянных флаконах из бесцветного стекла, по 100 мл в стеклянных флаконах из коричневого стекла, по 100 мл в полимерных флаконах белого и коричневого цвета.

1.4 Препарат хранят по общему списку при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.5 Срок годности – 2 (два) года от даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. После вскрытия флакона препарат необходимо хранить при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С, использовать в течение 7 суток.

Не применять по истечении срока годности. Хранить в местах, недоступных для детей.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с действующим законодательством.

1.6 Условия отпуска – без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Суправит – комбинированный витаминный препарат.

2.2 Витамины, входящие в состав препарата, оказывают синергидное действие. Витамин А регулирует функцию и регенерацию эпителиальных тканей, тем самым повышая защитную функцию организма животных. Витамин Д₃ участвует в обмене кальция и фосфора, обладает противорахитическим действием. Витамин Е, являясь сильным антиоксидантом, регулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает действие витаминов А и Д₃, регулирует функциональную активность репродуктивной системы, обеспечивает нормальное течение беременности и правильное внутриутробное развитие плода. Витамин К₃, способствует синтезу протромбина и проконвертина, повышает свертываемость крови; обладает гемостатическим действием. Витамины группы В играют важную роль в нормализации обмена веществ, регуляции нервных процессов. Витамин В₁ принимает участие в водном, углеводном, белковом и фосфорном обмене. Витамин В₂ участвует в окислительно-восстановительных процессах, в процессе всасывания и использования жиров, построении молекулы гемоглобина, влияет на правильный обмен белков и углеводов. Витамин В₃ является регулятором активности ферментов энергетического обмена, необходим для синтеза никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ) – коферментов многих оксидоредуктаз. Витамин В₅ участвует в процессах ацетилирования и окисления, участвует в углеводном и жировом обмене, синтезе ацетилхолина, кортикостероидов, порфиринов, гормонов коры надпочечников, оказывает регулирующее влияние на нервную систему и моторику кишечника. Витамин В₆ необходим для нормального функционирования центральной и периферической нервной системы, активизирует процессы всасывания из кишечника аминокислот и железа. Витамин В₁₂ регулирует процесс кроветворения.

2.3 В рекомендуемых дозах препарат не оказывает местно-раздражающего, сенсibilизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

2.4 Суправит по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Суправит назначают с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомалиции, тетании), в комплексной терапии для повышения воспроизводительных функций, а также как вспомогательное средство при лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалений слизистых оболочек.

3.2 Суправит вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи, смещая кожу в месте укола в сторону во избежание вытекания раствора:

- крупному рогатому скоту (взрослые животные): суточная доза 5-6 мл на животное;
- молодняку крупного рогатого скота (6-12 месячный возраст): суточная доза 2-3 мл на животное;
- лошадям (взрослые животные): суточная доза 3-5 мл на животное;
- молодняку лошадей (6-12 месячный возраст): суточная доза 2-3 мл на животное;
- свиньям (взрослые животные): суточная доза 2 мл на животное;
- пороссятам-отъемышам: суточная доза 1,5 мл на животное;
- пороссятам-сосунам: суточная доза 1 мл на животное;
- новорожденным пороссятам: суточная доза 0,5 мл на животное;
- овцам: суточная доза 1-2 мл на животное;
- ягнятам: суточная доза 1 мл на животное.

С профилактической целью (при стрессах, в период интенсивных нагрузок, высокой продуктивности, беременным животным, при нарушениях воспроизводительной функции, отставании молодняка в росте и развитии, в период вакцинации, дегельминтизации, выздоровлений после перенесенных заболеваний) Суправит вводят один раз в 2-3 недели.

С лечебной целью препарат вводят один раз в 7-15 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Супоросным свиноматкам препарат вводят за 1,5-2,0 месяца до опороса, стельным ковам за 2-4 месяца до отела.

3.3 При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

В месте инъекции препарата может наблюдаться изменение окраски кожи, самопроизвольно исчезающее в течение 10-14 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении признаков аллергии (сыпь, анафилаксия, кожный зуд, диспноэ) применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные средства и, при необходимости, симптоматическое лечение.

3.4 В случае быстрого парентерального введения или передозировки возможно развитие системных реакций (возбуждение, саливация, рвота, диарея, тахикардия, судороги).

3.5 Противопоказанием к применению препарата является гипervитаминоз и повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

3.6 Суправит не рекомендуется применять совместно с нестероидными противовоспалительными средствами.

3.7 Особенности применения у беременных животных, у животных в период лактации, у потомства животных не выявлено.

3.8 Убой животных на мясо и использование молока в пищевых целях разрешается без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ


5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промветсервис» (юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503 53 67).

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская ½, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена: РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Кучинский М.П.), ООО "Промветсервис" (Дмитриева А.А.).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
« 22 12 » 2013 г.	протокол № 143

