

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Доксивазол»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Доксивазол (Doxivazolium).

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: доксициклин, тилвалозин.

Лекарственная форма: порошок для приема внутрь.

1.2 Доксивазол представляет собой порошок от желтого до желтовато-зеленого цвета.

В 1,0 г препарата содержится 200 мг доксициклина гиклата, 125 мг тилвалозина тартрата, вспомогательные вещества: глюкоза моногидрат, лимонная кислота, аэросил.

1.3 Препарат выпускают в пакетах из металлизированной полиэтиленовой пленки по 50, 100, 200, 500 и 1000 г.

1.4 Доксивазол хранят и транспортируют при температуре от 2 °С до 25 °С.

1.5 Срок годности – 3 (три) года от даты производства при соблюдении условий хранения. Не применять по истечении срока годности. Хранить в недоступном для детей месте.

Уничтожение препарата проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.6 Отпуск препарата осуществляется в соответствии с требованиями законодательства государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Доксициклин относится к группе полусинтетических тетрациклинов, производное окситетрациклина. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Clostridium spp.* и грамотрицательных микроорганизмов: *Salmonella spp.*, *Escherichia coli*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bordetella spp.*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus spp.*, *Actinobacillus spp.*, а также *Chlamydia spp.*, *Rickettsia spp.*, *Mycoplasma spp.* и *Borrelia spp.*

Механизм противомикробного действия доксициклина связан с ингибированием синтеза белков путем обратимого связывания с 30S рибосомальной субъединицей чувствительных к препарату микроорганизмов и, тем самым, предотвращая связывание с их рибосомами аминоксилотранспортной РНК.

2.2 Тилвалозин относится к представителям нового поколения макролидных антибиотиков. Активен в отношении грамположительных микроорганизмов: *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus spp.*, *Clostridium perfringens*, некоторых грамотрицательных микроорганизмов: *Lawsonia intracellularis*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Brachyspira hyodysenteriae*, *Brachyspira pilosicoli* и микоплазм: *Mycoplasma gallicepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Mycoplasma meleagridis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyosynoviae* и *Mycoplasma hyorhinis*, а также *Chlamydia spp.*, *Rickettsia spp.*

Механизм бактериостатического действия тилвалозина основан на блокировании синтеза белка микробной клетки на уровне рибосом, путем инактивации фермента транслоказы.

2.3 Препарат хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и проникает во все органы и ткани, проходит через плацентарный барьер. Терапевтическая концентрация в крови сохраняется в течение 18-24 ч.

2.4 Препарат выводится из организма преимущественно с фекалиями, в меньшей степени – с мочой.

2.5 Доксивазол по степени воздействия на организм относится к веществам малоопасным (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Доксивазол применяют для лечения сельскохозяйственной птицы (цыплят-бройлеров, ремонтного молодняка кур) при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, микоплазмозе, стафилококкозе, орнитобактериозе, инфекционном синусите, клостридиозе, некротическом энтерите, диарее, холангиогепатите; свиней при энзоотической пневмонии, атрофическом рините, бордетеллезе, сальмонеллезе, колибактериозе, дизентерии, лептоспирозе, микоплазменном артрите, илеите, колите у поросят и других болезнях, возбудители которых чувствительны к доксициклину, тилвалозину.

3.2 Доксивазол применяют в следующих дозах:

– свиньям: 250 мг на 15 кг массы тела животного или 500 г на 1 т корма или 1000 л воды в течение 3-5 дней;

– сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур): 25-50 мг на 1 кг массы тела птицы или 250-500 г на 1000 л воды в течение 3-5 дней. Птице раствор готовят из расчета потребности в воде на одни сутки. Во время лечения птица должна получать только воду, содержащую препарат.

3.3 В рекомендуемых дозах препарат, как правило, не вызывает побочных явлений у животных и птицы. В редких случаях у свиней возможны аллергические реакции (эритема, зуд), при наличии которых, препарат следует отменить и назначить антигистаминные препараты и препараты кальция.

3.4 Не рекомендуется одновременное применение с антибиотиками из групп пенициллина и цефалоспоринов, линкозамидами (клиндамицин, линкомицин), амфениколами, рифампицином; животным, имеющим индивидуальную чувствительность к компонентам препарата.

3.5 Запрещается применение препарата птице, чье яйцо используется в пищу людям; супоросным свиноматкам.

3.6 Убой свиней и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 30 суток после последнего применения препарата.

Мясо животных и птицы вынужденно убитых ранее указанного срока, используют на корм плотоядным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится. Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного или несоответствии препарата по внешнему виду, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Промветсервис» (юридический адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. З. Бядули, 12/2а, тел./факс: +375 17 503 53 67).

Производитель: Филиал «Промветсервис-Альба», 222603, Республика Беларусь, Минская область, Несвижский район, пос. Альба, ул. Заводская, 1/3, тел./факс: +375 1770 27081.

Инструкция подготовлена сотрудниками УП «Научно-исследовательский институт БиоФарм» (Высоцкий А.Э., Лысенко А.П.), ООО «Промветсервис» (Дмитриева А.А.).